

¿Cuándo sospechar HANTAVIRUS?

Frente a la siguiente situación

Síntomas

En personas previamente sanas:

- Fiebre.
- Dolores musculares.
- Cefalea.
- Síntomas gastrointestinales.



Antecedentes de Riesgo

- Residencia, excursiones o trabajo en áreas rurales.
- Contacto con roedores silvestres, su orina y/o deposiciones.
- Desmalezar. Limpiar casas deshabitadas o bodegas.

Solicite

• Hemograma

- Desviación izquierda
- Plaquetas < 150.000
- Hematocrito > 50%
- Inmunoblastos > 10%

• RX de Tórax

- Infiltrado Intersticial (uni o bilateral)

¿Qué hacer?

Notifique a la Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI de Salud)

<https://www.minsal.cl/secretarias-regionales-ministeriales-de-salud/>

- Hospitalice en establecimientos con UTI (unidad de tratamiento intensivo).

- Tome muestra de sangre para confirmar el diagnóstico.

- Envíe muestra al laboratorio de referencia ISP, <https://www.ispch.gob.cl/>

LLAME A SALUD RESPONDE

600•360•7777

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO TUS DUDAS
24 HORAS, LOS 7 DÍAS A LA SEMANA



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile